

Planche I
Tafel 1
Procyathophora fürstenbergensis ECK




Fig. 1 — Section transversale; Hemmersdorf(Sarre).

Abb.1: — Querschnitt, Hemmersdorf (Saar).




Fig. 2. — Section longitudinale. Le plan de la section est parallèle à l'axe des polypières dans la partie extrême gauche de la figure.

Abb. 2: —Längsschnitt. Die Schnittebene ist parallel zur Achse der Koralliten [Einzelpoly-
pen] am linken Rand der Abbildung.




Fig. 3 — Polypiérite fortement grossi ave 5 septes courts et remplissage clair de la cavité.

Abb. 3: — Stark vergrößerter Korallit mit 5 kurzen Septen [Scheidewänden] und klarer Füllung des Hohlraums.




Fig. 4. — Polypiérite fortement grossi ave 5 septes courts régulièrement disposés. Remplissage foncé de la cavité.

Abb. 4: — Stark vergrößerter Korallit mit 5 kurzen regelmäßig angeordneten Septen. Dunkle Hohlraumfüllung.




Fig. 5. — Section transversale relativement bien conservée. Dans le remplissage un dépôt périphérique bien marqué de silice.

Abb. 5: — Vergleichsweise gut erhaltener Querschnitt. In der Füllung eine deutlich erkennbare Ablagerung von Kieselsäure.




Fig. 6. — Section longitudinale fortement grossie.

Abb. 6: — Stark vergrößerter Längsschnitt.

[Eingestellt: August 2014 (www.geosaarmueller.de)]